

金磊

外

【药物相互作用】

● 与强心苷类药物合用，可增加强心苷类药物的毒性，表现为心律失常、低钾血症、肾功能不全等。

● 与利尿剂合用，可增加利尿剂的利尿作用，导致电解质紊乱、脱水等。

● 与抗凝剂合用，可增加抗凝剂的抗凝作用，导致出血风险增加。

● 与降压药合用，可增加降压药的降压作用，导致低血压。

● 与镇静剂合用，可增加镇静剂的镇静作用，导致呼吸抑制、意识障碍等。

● 与抗酸药合用，可减少抗酸药的中和作用，影响其疗效。

● 与含铝、镁的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含铁、钙的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含磷的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含钾的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含钠的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含氯的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含硫的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含氮的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含氧的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含氢的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含碳的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含硅的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含硼的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含氟的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含碘的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含溴的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含砷的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含汞的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含铅的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含铋的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含钨的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含铈的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含镧的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。

● 与含铈的制剂合用，可减少其吸收，影响其疗效。